



ט"ו בשבט ללא תולעים

על פי ספרי הרב משה ויא שליט"א "בדיקות המזון כהלכה"

מעודכן לשנת תשפ"ב

1. פירות נקיים לא חיבים בדיקה מותלים

אטטich	חמציות	אטרוג מסוכר
אבקודו	פקאן מסוכר ("פקאן סיני")	לדר (באריזה סגורה)
אגוד אורן (צנובר)	קוקוס (שלם וטוחן)	מלון עגול
אגוד ברזיל	קרמבללה (פרוי הכוכב)	מנגו
אגוד מקדמיה	שדייפים מיבשימים	ערמוניים (קלופים וקלויים,
אגוד פקאן בקליפה	שימורי משמש	בראריה הרטמית)
אגס	תפו סיני מסוכר	פאפאייה
אננס בשימושים (בסיוף)	תפו עץ (טרוי ומיבוש)	חברים תוצרת חו"ל (בעל קליפה צחובה חלקה)

2. פירות שליעתיים נגועים טעונים בדיקה מותלים

ארגוני בקייפות הקשה (ארגוני מלך, בונדוק ושקדים)	בעת הקילוף בודקים אם מצויים "קורוי משי", פירותים כהים או זחלים בקליפה או על האגוז, ואם האגוז נראת מכורסם.
ארגוני בונדוק קלופים ושקדים קלופים	בודקים אותם משני צידיהם. אגוז בו נמצא "קורוי משי", סימני קרסום או נקב, חוץinos ובודקים אותו מבפנים. אם נמצא תולעת, יש לחצוט ולבדוק את כלום מבפנים (גם אם לא נמצא גביעות, טוב לחצוט כ-10% ולבדוק בפנים).
ארגוני פקאן קלופים	בודקים משני צידי האגוזים אם יש "קורוי משי", תולעים או פירותים כהים עגולים.
ארגוני מלך קלופים	1. מנערמים בתוך מסנןת בעלת חרומים גדולים על גבי משטח לבן ובודקים אם יש חרקים או תולעים בנשורת. 2. בודקים את כל האגוזים משני צידיהם, ובפרט בקפלים, אם יש "קורוי משי", תולעים או סימני קרסום.
ארגוני ושקדים קוצצים	מנערמים בתוך מסנןת רשת (מסנןת אורז) על גבי משטח לבן ובודקים אם יש חרקים קטנים בנשורת. שופכים את הנוגר במסנןת על משטח לבן ובודקים אם ישנם תולעים, חרקים או "קורוי משי" בין החצאים.
ארגוני קשי	בודקים את כל האגוזים מכחוץ. אגוז מכורסם או מנוקב, חוץinos ובודקים אותו בין שני החצאים. אם נמצא תולעת, יש לחצוט את כלום. (מעט פירותים חוצים בין החצאים הם שאריות הקליפה ולא גביעות). [גם אם לא נמצא גביעות, טוב לחצוט כ-10% ולבדוק בין שני החצאים].
אוכמניות	קפואות (AMIL): יש להשתמש במילוט עם שרורת מהודרת, רצוי לטחון בבלנדר. טריות: ראה בדיקת המזון כהלכה, כרך ב'.
מיובשות:	מיובשות: קשה לבודקם. לרכוש רק את המשווקות תחת שרורת מהודרת.
אנונה	קלף ולשטו. לפרק ולפלחים ולבדק אם מצויות ריקות לבנות בבראש הפרי.
אננס	טררי: לקלף ולחשיר את כל החללים החומרים המצויים תחת הקליפה. מיובש עם סוכר: להתבונן משני הצדדים אם נדבק עלי זבובן או חרב. מיובש טבעי: לשבור לכמה חתיכות ולהתבונן היטב אם מצוי זחל או פירותים כהים עגולים בחיללים הקטנים שבבראש הפרי. משומר במלח טבעי: עדיף להשתמש בשימושי אננס בסירופ.
אפרסמן	להוריד את ה"עליה" (שבسبب העוקץ) ולשטו. אם הפרי רך מאד, לבדוק מבענין. אם מצוי כתם שחור על קליפת הפרי, מקלפים באותו מקום ומתבוננים אם מצויות שם רימות לבנות. (נקודות שחרות קטנות בבראש הפרי אין סימן לגביעות).
אפרסן	בשימושים: להתבונן אם מצוי זחל בפירות או בסירופ.
גיאבה	לחחות פרוסות לרוחב הפרי, ולהתבונן היטב בכל פרוסה משני צדיה אם מצוי רימה. צבע הריקות כצבע הפרי, עם נקודה שחורה קטנה בראשן.
שיטה הוליפת:	שיטה הוליפת: לקלף את הפרי ולהתבונן אם מצוי אזור כהה רך במיוחד או נקב קטן. לחטור אזור זה ולהתבונן אם מצויות בתוכו רימות בתוך הפרי.
זרבדים	מסוכרים (לא חריצנים): לחצוט אחדים למדגム (כ-10%) ולבדק אם יש תולעת. אם נמצא גביעות, יש לחצוט את כלום ולבודק מבפנים. בסייעות: תוצרת אירופה: מתקומים - לפחות כל אחד ולבדוק. חמוצים בדרך כלל נקיים. תוצרת ארה"ב: בחזקת נקי. מיובשים עם החרצן (מצומקינים): בדיקות קשה ועדיף לא להשתמש. מיובשים (לא חרצן): תוצרת ארה"ב בלבד. בחזקת נקיים.
זיתים	זיתים יוקרים או מושחררים: אם יש כתם כהה, לחצוט ולהתבונן אם מצוי מחלת בתוך הזית. זיתים שחורים: יש לחצוטם ולבודק מבפנים אם מצוי מחלת או תולעת. טבעות זיתים (ירוקים או מושחררים): לשטו על צלחת וכדומה ולהתבונן אם מצוי מחלת או תולעת.
לדר לא ארזה	להתבונן כנגד האור אם נצמד זבובון או נמלה.
פרישלים	פרישלים: לחצוט ולבדק כנגד האור משני הצדדים. משמש מיובש
ענבים	1. מחלקים את האשכולות הצפופים לחילוקים קטנים. משרים את הענבים במים עם מעט סבון נוזלי ושוטפים היטב במים זורמים. 2. מסתכלים על כל עניב. אם רואים כתם כהה החודר לתוכו העניב, חותכים שם ובודקים אם יש תולעת בתוכו.
ערמוניים בקייפות הקשה	לחצוט ולבדק מבפנים אם מצוי תולעת או פירותים כהים, (אפשר לבדוק גם אחרי הבישול).
פירות מיבשימים:	להתבונן משני הצדדים אם נצמד זבובון או חרב. רצוי לשטו. אגס, אפרסן, חמוץ, מלון, מנגו, קיווי, פפאיה
קיווי	פנים הפרי בחזקת נקי. לעתים רוחקות מצויות נקימות לבנות או חומות על קליפת הפרי. יש להזהר שלא תעבורנה לפרי בעת הקילוף, או לשטו את הפרי המוקלף.

המשך ←

לע"ג הר"ר אברהם חיים בון הר"ר יצחק ע"ה לע"ג מרתה יראת קיילא הוה בת הר"ר חיים הכהן ע"ה לע"ג הרב אליעזר משה בן שלמה סאקס ע"ה
מותר לשכפל ולהפיץ דף זה לדיכוי הרבים מבלי לשנותו. ניתן להציג בטיל' 08-9766653 או בדוא"ל: teva.ramot@gmail.com • vayemoshe@gmail.com

רימון	אם מצוי נקב בקליפה, פוחחים ובודקים אם יש חולעת. בעת פירוק הגרגירים יש להתבונן אם מצויות רימות לבונות קטנות או חולעת חומרה בין הגרגירים. פס חום על הגרגיר אינו סביר לנגינות.
שסק	לפתוח ולבדוק את ה"כתר" שבתחתית הפפי, אליו עלולים לחדר חרקים קטנים. מגינה פרטית לחוץ ולבדוק אם מצויות חולעים בשער הפפי.
שקדמים	ראה אגוזים.
תמר	לחצחות בסכין, להוציא את הגלען ולבדוק משני הצדדים כנגד האור (לחפש חרק כזה באורך 3-2 מ"מ או חולעת בד"כ מהה, מיבשת וכלה).
תמר לח (קפוא)	בדרכ נקע, טוב לחצותו ולבודקו.
נקודות חיצונית: מציה בכל פירות ההדר געתים קרובות מצויות כיניות בצבע חום או אפור כזה על קליפת הפפי. לאחר הקילוף והחיתוך יש לבדוק שהכיניות לא נצמדו לפפי, וכן שלא עברו מחד או מהסכן לפפי. לחילופין ניתן לשטוף את הפפי אחר הקילוף. אם רצחים לשמש בקליפה - לשפשף בمبرשת קשה או בכירית מותכת ("גנס") עם נזול לנקיוי כלים, לשטוף ולבודק שלא נותרו כיניות.	
נקודות פנימיות: עלולה להיות ממוצאת בחפוזים, קלמנטיניות ואשכליות. עלול להיות גגוע ברימות לבנות. נקודות זו נדירה כאשר הפודטים מטופלים היטב, בפרט בעונת החורף. פירות מעצים לא מטופלים כגון מגינה פרטית, או מערבים בשנת שמשטה וכן פירות בעונת הקיץ עלולים להיות נגעים יותר. בעת הקילוף, יש לעיין בצד הלבן של הקליפה אם ישנו כתם חום או אזור רך במיוחד הנמשך לתוכו פנים הפפי, ולאחר מכן אם יש חדירה של רימות במקומם זה.	
ב. אם הפפי רך במיוחד וריח מושנה, יש לבדוק את פנים הפלחים. אם נמצא פרי נגוע, יש לבדוק היטב את כל הפירות מאותה קניה. מ"ץ הדרים - סחות ביתיה: רצוי לנ��ות את הפירות בכרית מותכת ונזול לנקיוי כלים לפני הסחיטה, כדי למנוע חדירת כיניות לימי. לחילופין, ניתן לסנן דרך מסננת צפופה: רצוי לסנן את המץ במסננת צפופה.	
פיזוחים גרעיני דלעת: עם קליפה (לבנים): בדרך כלל נקיים. אם הקליפה פגומה, יש לקלף ולבודק. קלופים (ירוקים): לנער במסננת ירקות על גבי משטח לבן ולבודק אם נפלו חולעים על המשטה. אם נמצא חולעים, אין להשמחש.	
גרעיני אבטיח: לפתוח ולבדוק מדגם של כ-10%. אם נמצא נגיעה, יש לפתוח ולבדוק את כולם. גרעיני חמניות: עם קליפה (שחורים): ציריך לקלף כל אחד ולבודק.	
קלופים (אפור בהיר): א. לנער במסננת של אורז על גבי משטח לבן ולהתבונן, אם נשרו חרקים קטנים על המשטה - אין להשמחש. ב. לפזר את הגרעינים על משטח לבן ולבודק בינויהם, אם נמצא חולעים - אין להשמחש.	
בוטנים: לבדוק את כולם מבחוץ. בוון בו נמצאו טימני קרוסום או סיקון של חידרת חולעת, חוץים ובודקים אם יש בו נגעות פנימיות. אם נמצא נגיעה, יש לחתוך את כולם ולבודק מבפנים. [גם אם לא נמצא נגיעה, טוב לחוץ כ-10% ולבודק בפנים]. בסוף הבדיקה חישומת לב מיעודה.	
בוטנים טחוניים: ראה אגוזים קצוץים. בוטנים מצופים (קבוקים, מצופים שוקולד וכדומה): לפתוח כ-10%, אם נמצא נגיעה - לפתוח את כולם. בוטנים בקליפתם הקשה: ראה אגוזים בקליפתם הקשה.	
פיסטוקים: מקלפים ומתובננים אם יש "קורו משי" או חל. פיטסוק עליו נראו סימני נגיעה, חוץים ובודקים אם יש בו נגעות פנימיות. אם נמצא נגעה, יש לחוץ את כל הפיסטוקים ולבודק מבפנים. [גם אם לא נמצא נגעה, טוב לחוץ כ-10% ולבודק בפנים].	

3. פירות הנגעים לעתים קרובות בתולעים מוחזק כנוגע

היביסקסוס	מציה בהם נגיאות גבוהה ואין שיטה בטוחה לנוקותם.
חבותים תוצרת הארץ	חוצים את הפפי. אם מצוי זחל או מחליה עם פירורים כהים, מסירים את האזור הנגוע. אפשר לבדוק לאחר הבישול.
חרובים	לשטוף היטב, לשבר לחתיכות קטנות (2 ס"מ) ולבודק אם מצוים פירורים, קורי nisi או חולעים וחרקים.
פטל	נגוע וקשה לבודק. יש להימנע מלאלוכן.
צימוקים	עקב נגיאות פנימיות המציה בצימוקים, כולל צימוקים מקליפורניה, מומלץ להשתמש בחומציות, כתחליף יעיל לצימוקים. במייה ורוצחים להשתמש בצימוקים, יש עדיפות להשתמש בצימוקים שעבורו בדיקות מדגמיות, כגון צימוקים שבଘשות בד"ץ העדה החרדית, אוזם יש לבדוק בדיקה יסודית כדלהלן: <ol style="list-style-type: none"> להשרות את הצימוקים במים כבישם כרבע שעה. לעורב ולהעביר את המים הערויים לצלחת לבנה ולהתבונן אם מצוים חולעים או חרקים חומיים במים. אם לא נמצא נגיעה - לשטוף היטב את הצימוקים תחת מים זורמים. צימוקים מיצור ביתי. ניתן להכין צימוקים נקיים בתנור בית. ראה הוראות בספר בדיקת המזון כהלה ח'ב.
תוֹת עַץ	נגוע וקשה לבודק. יש להימנע מלאלוכן.
תוֹת שָׂדָה	קיימות נגיאות כל-עולמיות של "טרפסים" קיטנים המסתתרים בשקעים של התותים ואין יורדם בשתיופות הרגילות; אך מומלץ לאכול חותם רך לאחר ניקויים באחד משני האופנים: <p>אוף א: להחזר בסכין את העלה הרוקע עם שכבה דקה מהפה ולהסר סדקים, חוץים עמוקים או איזוריים פגומיים. להשרות במים עם מעט סבון נזלי למשך 3 דקות, לשטוף מעט בתוך המים, ולשטוף היטיב (בכל פעם מעת תותים) תחת זרם מים באופן שהחכים יגיעו לכל הצדדים. יש להזרע על ההשריה והשתיפה שלוש פעמים ולאחר מכן לטלוח או לבלול.</p> <p>אוף ב: לקלף שכבה דקה מהפה מכל צדדי (כל השכבה החיצונית כולל חריצים عمוקים ומוקם חיבור העלה) ולשוטטו במים לאחר הקילוף.</p> תוֹת שָׂדָה קְפּוֹא: לרכוש רך עם הכשר מהודר ולהנhog לפני ההזראות המופיעות על האריזה.
תוֹת שָׂדָה מִסּוֹכֶר (מיובש עם סוכר): בחזקת נקי.	מציה בהם נגיאות גבוהה, ואין שיטה בטוחה לנוקותם. אפשר לבשל ולסנן דרך מסננת בד"כ, ולהשתמש בתמצית.
תְּאֵנִים (טְרִירִת וּמִיּוּבָשָׁת)	בריאות, הנמכו בchnerיות טבע נגיעות גבואה ובדיקתן קשה ומורכבת. אופן הבדיקה מבואר בספר "בדיקות המזון כהלה".

מענה לשאלות בטל' 53255588-02 בוקר ובערב בשעה 11:45-10:45 ובימים שישי משעה 2:00 עד חצי שעה לפני כניסה שבת.
ניתן להאזין לשיעורי הרוב ויא שליט"א ב"קול הלשון" טל' 03-6171039 • לצפייה באתר: www.kolhalashon.com